



PNEUMOKOKKEN- ERKRANKUNG: WIR SIND AUCH BETROFFEN

Ab 65 Jahren steigt das Risiko an
Pneumokokken zu erkranken



für weitere Informationen
lesen Sie bitte
pneumo-info.ch



WIE KANN MAN SICH SCHÜTZEN?



Vermeiden Sie engen Kontakt mit
kranken Menschen



Waschen Sie sich beim Husten,
Niesen oder Naseputzen die Hände
und achten Sie auf angemessene
Hygienemassnahmen



Lassen Sie sich impfen

WIE FUNKTIONIERT EINE IMPfung?

Informieren Sie sich bei Ihrer Ärztin oder
Ihrem Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke

IMPfEMPFEHLUNG DES BUNDESAMTS FÜR GESUNDHEIT (BAG)

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG)
empfiehlt die Pneumokokken-Impfung für
folgende Personen:

- Kinder unter 5 Jahren
- Alle Personen ab 65 Jahren
- Personen mit verschiedenen
Grunderkrankungen



MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftstrasse 4, CH-6005
Luzern Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA
und ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.
CH-PVC-00089, 06/2024.

WAS SIND PNEUMOKOKKEN-ERKRANKUNGEN?

Eine Pneumokokken-Erkrankung wird durch das Bakterium "*Streptococcus pneumoniae*" verursacht und ist die häufigste Ursache für eine Lungenentzündung.



DAS PNEUMOKOKKEN-BAKTERIUM KANN FOLGENDE KRANKHEITEN VERURSACHEN:



Lungenentzündung



Mittelohrentzündung



Blutvergiftung



Meningitis

WIE WERDEN PNEUMOKOKKEN ÜBERTRAGEN?

Sowohl kranke als auch gesunde Menschen können dieses Bakterium übertragen:



Durch Husten



Durch engen Kontakt mit anderen Personen



Beim Niesen und Naseputzen



Beim Küssen

WELCHE SIND DIE SYMPTOME?

Die Symptome einer Pneumokokken-Erkrankung hängen davon ab, welcher Teil des Körpers infiziert ist. Die Symptome einer Lungenentzündung sind:



Fieber und Schüttelfrost



Starker Husten



Schnelle und schwere Atmung



Schmerzen in der Brust

JEDES JAHR VERURSACHEN PNEUMOKOKKEN IN DER SCHWEIZ



Etwa 1'000 schwere Fälle von meist Lungenentzündungen



Etwa 100 Todesfälle



Etwa 80% der Todesfälle, welche durch Pneumokokken verursacht wurden, sind Personen über 65 Jahren.



DAS RISIKO FÜR INVASIVE PNEUMOKOKKEN-ERKRANKUNGEN STEIGT MIT ZUNEHMENDEM ALTER

~2x

Bei Personen ab 65 Jahren ist das Risiko einer invasiven Pneumokokken-Erkrankung (Ausbreitung in den Blutkreislauf) doppelt so hoch, im Vergleich mit Personen zwischen 50 und 64 Jahren.

~3x

Das Risiko, an einer Lungenentzündung zu erkranken, ist bei Erwachsenen ab 65 Jahren dreimal höher als bei Personen zwischen 50 und 64 Jahren.